

行徳総合病院 乳癌治療 登録レジメー一覧

レジメン名	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	投与間隔	備考
FEC 100	エピルビシン (EPI) フルオロウラシル (5-FU) シクロホスファミド (CPA)	注射 注射 注射	100 mg/m ² 500 mg/m ² 500 mg/m ²	Day 1 Day 1 Day 1	21日	総投与量 900 mg/m ² まで
FEC 75	エピルビシン (EPI) フルオロウラシル (5-FU) シクロホスファミド (CPA)	注射 注射 注射	75 mg/m ² 500 mg/m ² 500 mg/m ²	Day 1 Day 1 Day 1	21日	総投与量 900 mg/m ² まで
HER単独	トラスツズマブ (HER)	注射	8 mg/kg (初回) 6 mg/kg (2クール目以降)	Day 1	21日	HER2過剰発現を測定して投与设计を行うこと
DTX 75 + HER + PER	ペルツズマブ (PER) トラスツズマブ (HER) ドセタキセル (DTX)	注射 注射 注射	840 mg/body (初回) 420 mg/body (2クール目以降) 8 mg/kg (初回) 6 mg/kg (2クール目以降) 75 mg/m ²	Day 1 Day 1 Day 1	21日	HER2過剰発現を測定して投与设计を行うこと 6クール施行後抗体療法のみで切り替える
DTX 60 + HER + PER	ペルツズマブ (PER) トラスツズマブ (HER) ドセタキセル (DTX)	注射 注射 注射	840 mg/body (初回) 420 mg/body (2クール目以降) 8 mg/kg (初回) 6 mg/kg (2クール目以降) 60 mg/m ²	Day 1 Day 1 Day 1	21日	HER2過剰発現を測定して投与设计を行うこと 6クール施行後抗体療法のみで切り替える
DTX単独 75	ドセタキセル (DTX)	注射	75 mg/m ²	Day 1	21日	
DTX単独 60	ドセタキセル (DTX)	注射	60 mg/m ²	Day 1	21日	
ハラヴェン	エリブリン (Eriburin)	注射	1.4 mg/m ²	Day 1, 8	21日	・1回投与量は 2 mg で臨床的効果は十分であると言われている ・他の治療選択肢がない場合を除き0.7 mg/m ² までの減量は行わない
PTX + Bmab	パクリタキセル (PTX) ベバシズマブ (Bmab)	注射	90 mg/m ² 5 mg/kg	Day 1, 8, 15 Day 1, 8	28日	
カドサイラ	トラスツズマブ エムタンシン (T-DM1)	注射	3.6 mg/kg	Day 1	21日	HER2過剰発現を測定して投与设计を行うこと
nab-PTX単独 260	アルブミン懸濁型パクリタキセル (nab-PTX)	注射	260 mg/m ²	Day 1	21日	
GEM単独	ゲムシタピン (GEM)	注射	1,250 mg/m ²	Day 1, 8	21日	